

Amanita caesarea (Scopoli: Fries) Persoon

Nome volgare: ovolo buono o ovolo reale.



Cappello: 6-15 cm. da emisferico a convesso-espanso, margine sempre nettamente striato. La cuticola interamente asportabile, liscia e priva di verruche, può avere alcuni lembi bianchi residui del velo generale. **Imenoforo:** lamelle fitte, intercalate da rare lamellule tronche, libere dal gambo, di colore giallo, giallo zolfo a maturità. **Sporata:** bianca. **Gambo:** 8-15 x 2-3 cm. subcilindrico mai bulboso, attenuato alla base, pieno, poi midolloso, superficie più o meno liscia, interamente giallo, o comunque concolore alle lamelle, **anello** membranoso, ampio, pendulo, persistente e striato, concolore al gambo. **Volva** ampia e membranosa, persistente, a forma di sacco, carnosa, sempre con apice libero al gambo, bianca. **Carne:** soda e compatta, presto tenera, bianca, gialla sotto la cuticola e vicino alla corteccia del gambo. Odore e sapore lievi e gradevoli. **Habitat:** è amante dei boschi caldi e soleggiati, soprattutto querce o castagni su terreno acido (granitico). Cresce dalla tarda estate all'autunno. **Commestibilità:** ottima commestibilità, si può consumare anche da cruda.