

# *Amanita rubescens* Persoon

Nome volgare: Tignosa vinata



**Cappello:** 8-12 (15) cm. sodo e carnoso, inizialmente emisferico poi convesso, a maturità spianato, il margine liscio, colore variabile sul bruno rossastro, vinoso più o meno chiaro e sfumature rosate, cosparso di verruche farinose grigiastre. **Lamelle:** bianche e fitte, con tendenza a macchiarsi di rossastro in vecchiaia, arrotondate-annesse allo stipite, intercalate da lamellule. **Gambo:** liscio o sottilmente tomentoso, da biancastro a bruno rossiccio, robusto, talvolta molto slanciato 10 - 12 (15) x 1 - 3 cm. cilindrico, attenuato in alto e base bulbosa-radicante, la **volva** friabile, ridotta a scarsi residui farinosi, **anello** ampio e striato, membranoso, superiormente bianco con orlo e faccia inferiore concolore allo stipite. **Carne:** bianca ma al taglio ed alle abrasioni si colora lentamente di rosso vinoso. **Sporata:** bianca. **Habitat:** cresce in estate e autunno sia sotto latifoglie che conifere. **Commestibilità:** Solo ben cotta, a causa della presenza di sostanze tossiche termolabili (sindrome emolisinica).