

Xerocomus subtomentosus (L. :Fr.) Quélet 1888

Sinonimi: *Boletus subtomentosus* Bolton 1788

Nome volgare: Boletto vellutato



Cappello: 2-12 (15) cm. da convesso a spianato, carnoso, ma di consistenza piuttosto molle, asciutto e tomentoso, spesso con la cuticola screpolata per il secco; il colore variabile: tipicamente giallo-olivastro, ocre-olivastro, ma anche giallo ocre. **Imenoforo:** Tubuli non molto lunghi, adnati o appena decorrenti con l'età; da gialli a olivastri. **Pori:** ampi e irregolari, concolori, poi sul verde-oliva; al tocco virano al blu-verdastro. **Carne:** tenera, bianco-giallognola, più scura e fibrosa quella del gambo; alla sezione vira leggermente e irregolarmente all'azzurro. Odore lieve fruttato, sapore dolciastro. **Gambo:** 5-10 x 1-2 (3) cm. sodo, cilindrico, a volte ricurvo, asciutto, di colore giallo-pallido, percorso da costolature che, se si intersecano, simulano una specie di grossolano reticolo, o fibrillosità concolori o poco più scure. **Habitat:** Cresce dall'estate all'autunno sotto latifoglie e aghifoglie. **Commestibile**